

3C

1. **Quando cominciare l'alimentazione dopo il confezionamento di una PEG primo impianto?** 1
 - 1) Dopo 24 ore, velocità 40 cc/h
 - 2) Dopo 12 ore, velocità 40 cc/h
 - 3) Dopo 8 ore, velocità 40 cc/h
 - 4) Nessuna delle precedenti

2. **Sono fattori associati all'insorgenza delle ulcere da decubito...** 4
 - 1) linfocitopenia
 - 2) ipoalbuminemia
 - 3) calo ponderale
 - 4) tutte le precedenti

3. **Un paziente ha subito un intervento chirurgico a livello addominale. Per favorire la guarigione di una lesione da decubito detersa che interessi il tessuto cutaneo, sottocutaneo e muscolare è preferibile utilizzare...** 2
 - 1) medicazioni che asciughino le lesioni
 - 2) medicazioni che mantengano un ambiente umido
 - 3) l'applicazione di ossigeno senza copertura della lesione
 - 4) nessuna delle precedenti

4. **Il respiro di cheyne-stoke può indicare...** 2
 - 1) edema polmonare acuto
 - 2) lesioni cerebrali
 - 3) brocopneumopatia cronica ostruttiva
 - 4) nessuna delle precedenti

5. **I requisiti sostanziali e formali della documentazione sanitaria devono essere...** 1
 - 1) veridicità, chiarezza, completezza, contestualità e rintracciabilità, indicazione di data e ora precisazione nome e cognome, firma, intellegibilità della grafia
 - 2) veridicità, completezza, contestualità e rintracciabilità, indicazione di data e ora precisazione nome e cognome, firma
 - 3) veridicità, chiarezza, completezza, contestualità e rintracciabilità, indicazione di data e ora precisazione nome e cognome, firma, intellegibilità della grafia, annotazioni postume
 - 4) veridicità, chiarezza, completezza, contestualità, indicazione di data e ora precisazione nome e cognome, firma, intellegibilità della grafia

6. **La responsabilità nello svolgimento delle funzioni infermieristiche può essere...** 2
 - 1) civile, penale, giuridica
 - 2) civile, penale, amministrativa e deontologica
 - 3) giuridica, civile, finanziaria
 - 4) civile, penale

7. **Quale delle seguenti procedure riveste maggiore importanza nella prevenzione delle infezioni ospedaliere?** 4
 - 1) L'utilizzo dei flussi d'aria laminari
 - 2) La nebulizzazione
 - 3) L'utilizzo di luce a raggi ultravioletti
 - 4) Il lavaggio delle mani

8. **In caso di reazione avversa durante una trasfusione di eritrociti concentrati (il paziente manifesta brividi, cefalea, dolori, sensazioni di calore), è immediatamente necessario...** 3
 - 1) diminuire la velocità di infusione e chiamare il medico
 - 2) rimuovere la via venosa della trasfusione e chiamare il medico
 - 3) sospendere la trasfusione, tenere la vena pervia con soluzione fisiologica e chiamare il medico
 - 4) controllare i parametri vitali e chiamare il medico

3C

9. **Le verifiche PAI secondo la normativa 514/2009 e s.m.i. deve essere fatta...** 3
- 1) ad ogni modifica delle condizioni generali dell'ospite
 - 2) semestralmente
 - 3) ad ogni modifica delle condizioni generali dell'ospite e/o semestralmente
 - 4) trimestralmente
10. **In quali casi l'isolamento funzionale da infezione/colonizzazione sospetta o accertata da enterobatteri produttori di carbapenemasi non deve essere applicato?** 4
- 1) In un paziente autosufficiente ma non in grado di mantenere una appropriata igiene e controllo ambientale
 - 2) In un paziente, assistito da care giver non in grado di mantenere un appropriato controllo ambientale attraverso l'applicazione delle precauzioni
 - 3) Per droplet quando non è presente tra le unità di degenza nella stanza una distanza minima di 1.5 metri
 - 4) Tutte le precedenti
11. **Per valutare lo spettro più ampio possibile di BPSD nella persona affetta da demenza, quale tra le seguenti scale posso impiegare?** 3
- 1) BDI
 - 2) CDR
 - 3) UCLA - NPI
 - 4) CMAI
12. **L'appropriatezza delle cure palliative lungo il decorso della malattia...** 1
- 1) aumenta progressivamente con l'evoluzione della malattia ed è massima nel fine vita.
 - 2) aumenta progressivamente con picchi ad intervalli variabili.
 - 3) è massima al momento della diagnosi.
 - 4) tutte le precedenti
13. **Quali sono le modalità di trasmissione della Legionella in ambiente nosocomiali?** 1
- 1) Infezione di ferite
 - 2) Edema arto inferiore in cardiopatico
 - 3) Diabete scompensato in fibrillazione atriale
 - 4) Tutte i precedenti
14. **Lo stoccaggio dei prodotti farmaceutici deve avvenire in locali opportunamente custoditi. In particolare, devono essere regolate e diffuse a tutti gli operatori coinvolti le corrette modalità per quanto riguarda...** 4
- 1) Temperatura e le condizioni di conservazione, in conformità a quanto indicato sulle confezioni e sul foglietto illustrativo dei prodotti e ad eventuali precisazioni del servizio di farmacia
 - 2) I prodotti per i quali deve essere prevista la conservazione in armadi chiusi a chiave (es. stupefacenti e veleni) o in contenitori/armadi con opportune caratteristiche (infiammabili)
 - 3) La rotazione delle scorte, in modo da rendere accessibile, e quindi utilizzare per primo il prodotto con scadenza più ravvicinata
 - 4) Tutte le precedenti
15. **Quando è necessario annotare sulla confezione la data di apertura di un farmaco?** 2
- 1) Solo per le gocce oftalmiche
 - 2) Per i prodotti multiuso
 - 3) Per qualsiasi tipo di farmaco
 - 4) In nessun caso
16. **Qual è la scala di rilevazione del dolore somministrabile al paziente collaborante con claudicatio intermittente?** 2
- 1) BRADEN
 - 2) NRS
 - 3) PAINAD
 - 4) NORTON

3C

- 17. *Il lavaggio antisettico delle mani è indicato...*** **2**
- 1) prima di qualsiasi azione che preveda un contatto diretto con l'utente
 - 2) prima di eseguire delle procedure invasive
 - 3) prima di indossare i guanti sterili
 - 4) dopo aver eseguito delle procedure invasive
- 18. *La terapia del dolore...*** **4**
- 1) deve prevedere somministrazione ad orari fissi
 - 2) deve prevedere una titolazione per trovare il dosaggio adeguato
 - 3) deve prevedere una rescue dose (al Bisogno)
 - 4) tutte le precedenti
- 19. *Prima di effettuare la contenzione fisica su un ospite, l'infermiere deve riportare sulla documentazione infermieristica...*** **4**
- 1) se sono stati tentati altri interventi meno restrittivi
 - 2) se c'è la prescrizione del medico per attuare la contenzione
 - 3) l'intervento è clinicamente giustificato e sono state considerate le condizioni generali del paziente
 - 4) tutte le precedenti
- 20. *Il registro esaurito di carico/scarico delle sostanze stupefacenti per quanto tempo deve essere conservato?*** **1**
- 1) Per due anni dall'ultima registrazione
 - 2) Per cinque anni dall'ultima registrazione
 - 3) Per tre anni dall'ultima registrazione
 - 4) Deve sempre essere conservato