
601 - **La scala di Barthel è uno strumento per:**

- Valutare il grado di autosufficienza di un soggetto**
- Valutare il danno sensoriale di un paziente
- Valutare l'estensione delle ustioni
- Individuare pazienti a rischio di lesione cutanee da pressione

602 - **Come si trasmette il virus Sars-Cov-2:**

- In modo diretto, indiretto e per contatto stretto con persone infette attraverso secrezioni della bocca e del naso**
- Solo per contatto stretto
- Solo per contatto diretto
- Solo tramite secrezioni della bocca

603 - **Secondo la normativa vigente, per accreditamento si intende:**

- Il possesso di requisiti predeterminati**
- L'adozione di un sistema di pagamento a tariffe predeterminate
- La registrazione di tutte le prestazioni erogate
- Tutte le risposte indicate

604 - **L'anuria è la:**

- Mancata produzione di urina**
- Produzione di urina < 500 ml/24 ore
- Produzione di urina > 500 ml/24 ore
- Mancata emissione all'esterno di urina presente in vescica

605 - **Per placebo si intende:**

- Una sostanza inerte o comunque priva dell'effetto farmacologico atteso**
- Un farmaco la cui somministrazione è sempre controindicata nei bambini
- Un eccipiente con ruolo di veicolo per il farmaco attivo

Un farmaco con effetti prevedibili e ben noti che viene somministrato a pazienti depressi

606 - **L'infarto è:**

La necrosi ischemica che consegue all'occlusione completa e brusca di un vaso arterioso terminale

La rottura accidentale di un vaso arterioso, che causa spandimento nei tessuti circostanti

La complicità infettiva di un distretto necrotico alquanto esteso dell'organismo

La presenza in eccesso di liquido in un tessuto o in un organo inducente una condizione di turgore

607 - **Il codice deontologico è:**

Uno strumento che regola i comportamenti degli operatori sanitari

Uno strumento per la difesa degli operatori sanitari

Uno strumento per la difesa del lavoro

Uno strumento di orientamento contrattuale

608 - **Quale è il tempo necessario per eseguire il lavaggio sociale delle mani?**

40-60 secondi

20-40 secondi

60-90 secondi

Nessuna delle precedenti

609 - **La sindrome da immobilizzazione o da allettamento:**

E' una riduzione della funzionalità dei vari apparati, che si manifesta quando una persona è costretta al letto per lungo tempo

Si manifesta in egual misura in giovani, adulti e anziani

È un caratteristico desiderio dell'anziano di restare a lungo nel letto e a riposo

E' tipica di anziani colpiti da decadimento intellettivo

610 - **Nell'anziano la stipsi può determinare:**

Confusione mentale

Cachessia

Disidratazione

Disappetenza verso la carne

611 - **Ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, chi è l'RSPP?**

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Referente per la Sicurezza e il Piano di Protezione

Il Rappresentante del Servizio per la Prevenzione e la Protezione

Il Revisore dei Servizi di Protezione Periodica

612 - **L'empatia è la capacità:**

Di mettersi nei panni dell'altro, come se fossero i nostri, pur senza provare le sue emozioni

Di vivere le emozioni dell'altro riuscendo così ad esserne coinvolti

Di ascoltare attivamente il cliente

Di riformulare correttamente al cliente, senza che avverta un atteggiamento indagatorio

613 - **Quale scala si utilizza per la rilevazione del dolore in un paziente adulto collaborante?**

NRS

BARTHEL

PAINAD

GLASGOW-COMA SCALE

614 - **Le cure palliative hanno come obiettivo:**

Il miglioramento della qualità della vita

La possibilità di evitare una terapia chirurgica

La riduzione delle dimensioni del tumore

La prevenzione di recidive

615 - **La sorveglianza sanitaria può essere definita come la:**

Valutazione periodica medico-fisiologica dei lavoratori esposti

Misura degli agenti tossici o loro metaboliti nei liquidi biologici

Diagnosi e la terapia delle malattie professionali

Cura e la prognosi delle malattie professionali

616 - **Le precauzioni standard debbono essere utilizzate:**

Nell'assistenza di tutti i pazienti

Solo durante le cure igieniche

Nell'assistenza di tutti i pazienti infetti

Solo nei pazienti con sospetta patologia a trasmissione ematica

617 - **In quali casi gli aghi e altri oggetti taglienti monouso devono essere eliminati seguendo precauzioni atte a evitare punture e tagli accidentali?**

Sempre, indipendentemente dalla natura del paziente sul quale sono stati impiegati

Solo quando sono stati utilizzati per pazienti HIV-positivi

Solo nell'ambito del servizio di Pronto Soccorso

Solo quando sono stati utilizzati per pazienti tossicodipendenti

618 - **La calciparina deve essere somministrata per via:**

Sottocutanea

Intramuscolare

Intradermica

Orale

619 - **Quando un paziente mantiene il decubito laterale, le lesioni da pressione possono formarsi in corrispondenza di:**

Orecchio, coste, grande trocantere, condili, malleoli

Zigomi, scapole, gomiti, coccige, talloni

Orecchio, coste, trocantere

Osso parietale, condili, cresta iliaca, malleoli

620 - Per confusione mentale si intende:

- Uno stato di obnubilamento della coscienza**
- Una situazione di disorientamento esclusivamente dello spazio
- La perdita di coscienza
- Uno stato di disorientamento esclusivamente spaziotemporale